
編并上班統 附錄圖解



险。 血陽 我叙 西越相多上数百位。一次四部的成体 為原政情情不多的 祖婚婚后他的是 看的湖健地之思是四路 厭。 偏。即必任剥生吞。为後处 之小鄉。其民粗豪多方 数個

借子私夫·以務就挺处特起。从 達其志。不你佛我就友智家松 之士、校之る多陷其力失。福者な 此心的被軍死為新多不顧。自 乃醫見于多世田抱怪器 息此为真然敢冰水野人 一诸賢文的磨淬鸡。不够

马台杉雅木


送 当。自七十之我仍多了各者心与 松其席。各庸余言也多弱为 金序,各只地路。且題 死全任。歲以子 中 差 惟其業。七

是以君子黄年立志也不好。 かずるそのかこ。故夫 自奮的松的路起地。如 機であるの陷其身者。と 个 特多及的 围横我的 志之不立。此

万舟

马在想那七

文化癸有三月上已悠る 望城蘇天褐投丹書



如 多多 本文記 IR. 3

万角 大家之萬一再 と決るな以外を変 八藝等的燈之上後已於 務道水水有為松谷 伎俩迁松其夸屯 る盖其分上多地で国

多 丘 立果实

酒舟 化祭商惠三月

3 三十十万人

连 优 — 《	被膜胎	雄娘小便閉並臨產小	惡阻	胎水	姙娠溲血	漏胞	育胎	乾之卷	産航目錄
の一長子妻或を	臨產 光坐 州術	小 便 開 附 導 水 術	妊娠下利	 	孕婦左腿痛	胎動胎漏	候孕論 光術	·續廣鐵鬼	金彩香华 自经

脫肛並復術	脫膜遺於陰戸	/ 浮漂術	産後小優閉並洩法	學生並舉學術	神手產光橫產論	瘦病	發癇論並救術	坤之卷	京州 ネスー
産後昏暈 目録 単	餘肉脫出截法	脫宮並飲術	整胎術	崩血並遏術	坐產附術	倒生並抒倒術	産後發癇	の意思を登録録	(1754 方方

産航例言 若手術。僕尤家常爛熟只恐手生荆棘臨時不 雖然優游講歷墨而行之莫不神妙集手下。聽哲 集中所載方法。客示準的非調全備蓋生生之機 設施至其妙用蓋非華頭之所能傳放舉大概耳。 **豈獨仙家不必更求遠** 通遊地自有助用翡翠明珠。非唯南海金丹大藥 變狀百出難以方隅論矣雖然平生把此融會買

声册 航。全屬畫餅賜覽君子。莫然是幸。 號合。倘草草看過。東諸高閣更不留意此一部産 治證係同藩人氏者。皆不書地名。他則一 賀川蘭齋先生譯某僕於京師受業之師也故獨 引用主方。畧書出處然一一不類恐及增煩 之微謬也敢云自有發明。 私說一二與先覺不合者即是牧牛兒識關牛圖 以確其事。非故為遠近親疎也。 ええて 英台村前本

余之固陋。或其取效得驗。全由先覺之靈,決非獨 自成家者也起號越人。原應有受活陳華陀。生亦 無傳光五革手 談笑解牛。此等之症不足為意也萬一有不測命 人委我以身命感當應之以忠誠竭吾力耳勿謂 以告同志 握拳透爪。無所歸罪。此僕平生惕厲所在。特舉

产舟 老之一 0 = 一見当有前村

産航

育胎

飫肥

桑原惟親敬夫

著

凡人既禀精至分娩期。莫不母氣以後之。氣即食氣

胃腑之所主也當夫娠孕時。若飲食傷滞。胃氣不運 則其胎即死磨鳥之菢,卵其肌溫融迥卯內化成錐

之不能成難以母氣中絕而無後之也。然則胎之資 毋氣而生成不亦較然乎然。世人曰。兒之在腹內也 焉溫亦氣也若一旦棄去。俾卵數日結合則雖再苑

世人 巨 見之在 腹內也

致見不有醫士亦有以此為是者不思甚矣夫胞帯 有乳絡灌口見資以有然或有母誤改則乳絡失所 老之一 〇三二年五村旗材

地氣於枝葉盡莫不然此不須饒舌而明矣。 續至所中。為運母氣而已。視之卉木。其有理脈而達

候孕

始身者。經止三四日。而有血小下。後八十五日。乃可

候ご

實腹以壓子巢故多難辨。

經閉三四月。未審妊否者。須早朝候之既飯則食氣

婦少行。而瘦弱之婦多行然亦有血熱燥乾或鬱火 不順也以血環乎全身而不下行故爾大凡肥満之 婦人有因積壞疝廢屬而一兩月經閉者其是否難 含溫潤氣力不動地位而無疼痛此亦異於五塊名 肥満婦人有歲及笄而無經者。世人以爲不順。此非 者而男子則胸下至横骨孕婦是臍下横骨間按 大凡婦人腹軟弱如虚其及孕類壮年男子腹拘絕 即决故如此者須騎月按之其物漸大含溫潤氣力

产用 熾焦因致瘦弱而經行少者蓋難一定也 老之一 C 英名旗泥水

蘭齋先生日。産後未經行而尋孕者。難辨何月大抵 婦人自按其腹驚於一塊應手。始請診察須問其塊

動否動則凡定為經六月也。

沒一交涉。血塊者在左小腹血室其狀尖稜推諸 風塊。氣塊者。多在胸下而動焉,惟親霸按凡孕。皆 又日類孕有五塊日氣塊日血塊日便塊日水塊日

容而痛甚者從任脈左斜大如瓜水塊者腑下寸 則痛便塊者右小腹磊磊食脂毒擠諸左則學於

行則愈之五塊皆經閉而非孕者也。如風水二塊。虚軟 者。鳩尾至横骨通腹起脹內如空虚故名風塊此經 孕。精水止在官中也施按腹術則水下而消馬風塊 自有判然者。但此特罕見矣。 圓弱。頗類孕焉然果是也則手下並無實氣力。其中 大如雞卵或如瓜而小表落此方將孕有物不能成 術浹月有水或血下乃施手術與家方蘇木湯二 大如瓜而無氣力。余日此水塊也治之以藥與手 柳田氏妻經閉四月。請余診之臍下任裏有一塊。

声船 此術詳於產論及異中。今有別法。先命婦人仰即醫 非積聚疝凝屬與於是含溫潤氣力。軟軟應手者。孕 按及所下。而須審其物非拘擊與非鬱結氣滯風和 手則與婦虛里動既而析拇指與四指當其心下順 者其左邊平心靜氣分膝頭而坐左手覆左膝上右 旬餘一夕小腹攻痛。卒然水迸其色清澄。翌早水 果如余言 止痛亦隨減腹中無物余日。出三旬則必有經行 候孕術 老之一 ご、土 みき 村 前 を

蘇木湯 者候之不應於指頭須指頭如剝腹皮灣人横骨內 於是乎可得虚實。 受孕之地。在臍下任道横骨內以子巢在焉横骨隆 烏藥各牽牛 蘇木 大黃各 治水血二塊及勝離。 右九味煎服若有寒者。去芒硝加附子桂枝。 芒硝小谷 枳實 牡丹 桃仁 呉茱

产角 ()漏胞 えた之 學既等有所 新去京風照明一時 女告私 明本

既孕。有每月血小下者京師俗。謂之戰孕。劇則然至

造突然血大下。肢體倦惰頗異乎往年其後血且 明珍氏妻。每孕多墮胎然未太害嗣復孕。亦似將 止且下。至八九月。又盆劇請余治。余謂有人日。此

漏胞也今脈全無氣力。血盡則胎死且促毋命危

不旋踵群去三日血盡竟不娩而斃。

染工某妻姓城五月至八月漏血不止百方無驗。

竟不起此亦漏胞也世雖以孫真人為奇此症怨 非藥力之所及徒視其死而已然舉其方聊備搜

覽。

千金方云。姓城血下不止名曰漏胞。血盡則子死。 凡死胎者皆官口開焉獨如漏胞數下血而宮口毫 乾地黄檮末。以三指撮許酒服不過三服蹇。

不開也

○胎動並胎漏

李模曰。心腹扇而下血者為胎動不痛者為胎漏今

直角 蓋虛贏之婦。化房壓傷其胎因致此也須以整胎浮 難其有宿疾而胎不旺每致墮胎此患亦不易防焉。 古人所謂胎漏又漏胞者。並是宮內蓄血耳。非自胎 若胎漏是經血溢餘而下者也故遇此證須問平常 按心腹痛剔則腰痛下血。此因别症發者耳。宜隨症 若胞也而胎漏是平日經血多行之婦。孕尚溢餘而 漂二術治之。安胎飲若膠艾芎歸湯主之。 治之。然疾劇而致胎動着多吃胎雖有治法濟全特 經血多少常多者。餘漏血也或腹腰微扁而下血者。 * 老之一 〇七一英名村震材

血也。 古苓术湯 或天禀虚弱。自然孕地不詢宮口不關所以時時漏 安胎飲 陳皮各五 當歸 芍藥 生地 白术各一 下者。無害於胎。軍安胎若漏胞則因有宿疾致 治胎氣不安。腰腹微扁。飲食不美 右姜煎溫服。 紫蘇 砂仁 子芩 人參 川芎 甘州各三

產 廖艾芎歸湯 加味三補先 子萃而 白术五 治胎四五月欲隨不安甚故也 今本干李 挺之古杜續先加杜仲續斷屢經驗 右水煎服凡欲墮者前日必腰痛此即胎動也 右水煎服。 治胎動不安若下血在八九月內小加砂仁。 艾葉 老之一 川芎 當歸養谷 甘州二

當歸散 當歸 黄芩 香附子 白芍 亦可。 唯易產胎無苦疾。産後百病悉主之照常煎服 右杵為散酒服方寸七。月一再服。姓辰常服則 金匱云婦人姓辰宜常服 治血黑成片者。 右為末。蒸餅為、光明常煎服。亦可。 下海中 通為多方面的 在沙漠 芍藥 川芎谷一 黄芩 多洲 黄連 黃柄各等 白术片半

对所 时後方學氏經 膠艾當歸湯 榆白皮两 羔換天花粉有驗 散加天花粉。最妙。今按姓城内熱而渴甚者。石 李挺日熟者下血。必多內熟。作渴者。金匱當歸 右生姜煎用。 姓婦暴卒下血數斤。胎躁不動者。此方主之 姓辰胎動下血。或每墮胎。三四月必下血季旋 ノオン 當歸 地黄為三冬葵子升 ではない。 の河河 1月1日オガオ 物湯。四物膠艾湯。海螵蛸湯類又一種有似溲血。而 有之而不由戶也雖不害於學而勿輕視宜加味四 甚則危大補湯主之今按尿道下血。下焦濕熟者。必 **産論曰。** 澳血者。內熱也。凡諸血不由戶者。不害於孕。 阿膠品絕 右先煮七味。去滓。內阿廖姓之頓服 所謂熟者。下血必多此方甚郊。 艾葉 甘艸 黄芩 當飯 芍藥

婦人蒙昧不能自辨醫切檢之勿誤主治 四物膠艾湯 加味四物湯 自精道下血者即崩血也甚者不日預焉宜疾投補 血良方。若胎動漏下則自人門下血彼此自别雖然 万角, 髮灰 當歸 右照常煎服 治下焦濕熟溲血者 **芍薬** 川芎 黄柏小谷 もえ 地黄各 0 山梔子中 关色核能材 海螵蛸湯 龍骨蒲黃散 龍骨養 江教過轍恐無及 懷之遇産前後崩血者即可投之不然則吸西 右為末。酒調服此備急遏崩之一良方也醫常 治尿血久者。 照常煎服。 李挺日。尿血稍虚者主之。據本方。加阿廖艾葉。 蒲黄五

酒舟 大補湯產 黄柏小 **芍**藥 黄茂 人參 白术 茯苓 當飯 海螵蛸即烏賊骨) 孕婦左腿痛 右作大劑。水煎溫服 右以水二合半。煮取一合半服 治孕婦溲血或血冰 桂枝合五 老之 甘州 乾地黄 橙皮 0.1 甘艸 川芎

之此症必當左臍伤下。左腿上有一急筋强按之。自 飲主之。今按以為瘀血者。左為血室故乎然余憂驗 産論日孕婦左腿漏有派血也産後療之可也折衝 加味抑肝散 以其屬肝經也沒加味抑肝散奏奇效 左胸下彎于足而痛恐是疝癥所致疝廠必多在左 治妊辰左腿痛或兩腿根。或左小腹彎急而痛 當飯 立方 白术

將桂湯 酒瓶 將軍者 桂枝 芍藥 干薑分七 甘艸分 大枣、 治一切腹漏在右。及大便秘結而漏者 也大便快利者前方。有燥屎者將桂湯。 右照常煎服或加黃連五分。 又有右股根攀急于右小腹而漏者。此必燥屎 右水煎服兼用潤腸丸。更可。 芍藥 吳茱萸命三 甘艸牛分 アを之 Control to

李挺曰。好孕經血閉以後胎胎中挾水濕與血相搏 濕氣流溢故今面目肢體遍身浮腫名口胎水又 潤腸丸 **○胎水** 腫多五六箇月有之原因煩渴引飲大過或泄 大黄 治 右末糊光。麻子大常服十五九不敬者。二十九 白湯送下。 切秘結。有燥屎而為害者。 蕎麥各等 川芎 半

損傷脾胃虚不能制水血化為水所制宜五皮散倍 為度仍常煮鯉魚粥食之 殘疾。或生下即死子母難保宜鯉魚湯至腫消水散 胎中蓄水所致若不早治必然其子手足軟短形體 又曰。姓辰五六箇月。腹大黑常高過心胸氣逆不安。 加白术為君。氣喘。小便不利者。防已散濕熱盛者單 山栀。炒為末米飲調服 横産露一手家人遷延余其脈微細面色如土頻 浪華江戶堀街綿買某妻。姓辰七八月。腹淌脹大。 もえ 〇十三一英多有亦木

又引之全身隨脫蓄水沛然下而胎既死形尤許 以為于脹潦之至期不減遂娩一男子大如五月 同新報街八尾氏妻姓城八月腹滿如敦衆醫皆 残疾者。水氣所致也 水數行。脹滿順減至期易娩子母安健。因知往之 比及五月復腹滿漸大與加味五茶散即腹漏下 炯炯如生李氏所謂形體殘疾者此婦次年又至 怪。顛顛斷絕。肉色濃紅。如截西瓜兩目各在額邊。 煩悶。乃執所露之手。徐引之。纔脫半身其狀鉤彎。

五皮散 陰穴。手足各一前。此婦亦是好時腹満。臨盆水大 荒木氏妻。生一男子不曾發聲。頭面如常而無二 而膜中有蓄水。因致腹滿也漢之潰然溢褥須史 胎而腹滿如着余按之有一堅塊。自謂必是孖胎 又生一男子大如六月胎前者即死後者五日而 下馬此等殘疾由辯之不早辯也隱殘疾無 治風濕凝脾經面目虚浮。四肢腫滿心腹膨脹。 へ老之一 一共名相能包

單山梔子丸 山梔子 治肺與大腸且能解五臟結氣補少陰經血。 大腹皮 桑白皮 右水煎溫服。忌生冷油腻堅硬物一方去桑橘 右炒黑為末蜜丸服加破故紙能滋陰降火 皮。換地骨皮正加皮治、妊娠子氣醫學 等人用作用作品的人工作品的人工作品的 上氣喘息。 茯苓皮 生姜皮 橘皮五各

鯉魚湯 **鯉魚雕本論。雕。一作粥,按** 當飯 芍藥各一 茯苓 白术卷二 治妊娠五六月。胎水腹大黑常高過心胸。 不可屈伸。 治水腫滿悶氣急不能食皮膚欲裂四肢常疼。 少許。同煎至一盏空心服未愈再服 右煮鯉魚一箇清汁一盏半。入生姜一片。陳皮 用鯉魚十兩葱白一握。麻子一升。取汁煮作羹 人老之一 心战即改效就能募 Maria Maria Maria 英古君亦も

履入鹽豉姜椒調和空心漸服

加味五苓散

治妊辰腹滿。小便不利。腰却浮腫。此水氣所致

满臍下如覆杯者.祗當行手術,湯藥取効難矣 也若五六月。或至期月。胎塞横骨,小便不利腹

茯苓大 白术 桂枝 精令 澤瀉

附子中各

右水煎溫服若大便秘結有燥屎者加大黃快

通腹満頓減

一級脚子氣水桶

者亦甚罕。又有両脚大腫。遂至于腰腹甚者腰間膝 食甚至足指問有黃水出者謂之子氣宜天仙藤散 漿水濕。下流。微腫者。易産名日級脚。腫甚者平目加 皆無害於胎而見頭面浮腫者最少足指問黃水出 术瓜散。挾外感者。檳藥散。自脚面腫至膝腿喘問妨 分水煎服。重者加高陸 李梴曰。妊孕七八箇以來。兩脚浮腫。頭面不腫。乃胞 余療孕婦。歲以千數。大凡両脚浮腫或両手微腫者。 如脚腰腫者。腎着湯手脚腫者用赤小豆桑白皮等 かんとう 〇十六一英名楊龍杉

平胃加木瓜散 此症季春至一仲秋多有之蓋以天温之際。埃理悟解。 其色澄白者以三稜針刺之無度腫隨手减。手法 腫病。則大有逕庭。非可與此同論。 而已其所以無害於胎者。以與胎水果也至總身水 風濕易侵而孕婦腹內實滞腰下虛脫故必多,而即 理堆開。狀如蜂窩必前陰大腫。衣被觸之不勝疼痛。 温補炒熟。消導生用。 和脾健胃。扶根固本。兼有他症既依藥性加減。

酒魚 **檳蘇散** 天仙藤散 養术養 陳皮四分 厚朴美 甘州分 木瓜 天仙藤 即青木 香附 蘇梗 香附多二 甘州 陳皮 無柳 右姜葱煎服。加茯苓。亦可。 指間有黃水出。名曰子氣。 治孕婦両足漸腫。以致喘悶飲食不美。甚則脚 右姜枣煎入鹽少許温服。 治風濕脚氣流通氣道 烏藥 〇十七二英名相信杉 陳皮 木瓜養各

防已散 防巴美 介五 治妊娠腫満喘促。小便不利。 右姜煎入紫蘇木瓜各三分二片同煎。日一 右姜煎服。 産前後投之。沈香須是絕品 腫消止藥。今按喘悶者。小青龍湯加沈香。不問 桑白皮 赤伏芩 紫蘇各二

腎着湯 赤小豆湯 干姜 伏葵卷二 甘艸 白术卷 甘。因減之無効。余近單甘州末作糊丸以本方 右水煎。空心服。凡甘艸多量方。患者多惡其太 治腎虚傷濕身重腰命如坐水中不渴小便自 治両脚腫。小便不利。其腫至腰間及宜一切脚 送下 でナバー多されずする 有兼姚蟲者。不此此則治淡飲和腹而不効者更攻 氣有來飲疝瘕之懷毒者。必思之輕者不藥自愈又 孕婦三四月內外率有此疾心中慣問。此飲食或痰 飲苦水好嗷酸菓頭痛體情。起即昏暈大凡惡聞食 右加、夢歷伏苓各一戔。生姜三片。以水六合。煮 赤小豆合桑白皮 〇惡門 取三合去滓温服一合。 氣腫満者。 商幸分五

飲平常當吐逆何必及孕始患此乎。日孕則經閉下 腹實滞。氣難派通夫氣如水貴派通思凝滯下室則 上藝所以為吐逆也 凡孕。思唱吐咳逆者。以心下揮支飲或問心下揮支 此惡阻也。皆不信日。此婦數産。未會惡阻今何以 躁。其腹微滿。而膽下有温潤氣力。更無一塊。余日。 浪華阿波橋畔。鰻魚店長七妻。經閉三月。嘔吐煩 病諸既而吐逆益劇大便秘結不圖十餘日。轉治 〇十九二支き有が水本 入咽、軟吐與桂枝湯加附子吳茱史半夏一服亦 孕如前症便投此方。即應又有一婦患此症藥食 瘀血作漏方,只恨無與之。頃某失妻。常患疝瘦及 此疾也。王宇泰證治準縄。載桃仁當飯湯。治和因 阻後翻病之。盖是前産惡露未驚因成凝結而發 余鑑之不类雖然幡然嗚呼何及按此婦前不思 如狂。一日水血並下。而小産終死至此親戚始知 數醫或攻此或治食積不見寸效八月後積贏落 害所竹鄉湯千 半夏 生姜 茯苓 青皮 者。小半夏加伏苓湯主之。 今本於小 半夏湯。加伏今青皮。金匮云。嘔家本 治惡阻 夏湯主之。又云卒嘔吐。心下痞膈間有水。眩悸 渴渴者欲解。今及不渴心下有爽飲故也。小半 右水煎服嘔吐甚者。以伏龍肝清汁煎之温服 **夹台**標端本

厚朴四	橘皮湯 冷凤前。	华夏生十	青竹節 橘皮冷片 茯苓 生姜香一治正尿恶阻。嘔吐不下食。
-----	----------	------	------------------------------

茈苓湯 加味二陳湯 指述七氣湯 治常有積聚及孕嘔吐者。 三綾 益智 青皮 桔梗谷等 甘州小 茈胡 半夏 治常有和及孕氣滞患思阻者。 係本方。加什筋生姜各等分。水煎服 右水煎服大便秘結者。加大黄枳椰。 莪术 藿香 香附 えも之一 治有淡飲吐逆者。 茯苓 白术 肉桂 澤鴻 英名樓龍松 陳皮 猪苓

紅九子 治疝方 治和兼食積孕必恶阻者。 山查 香附 呉茱萸 山梔炒 金鈴子分等 山查 唱立止 右生姜水煎服。大便秘結者。加大黃得快利。則 右姜水煎服。 青皮谷 酢 茴香大 荔核 山梔分等 甘州 枳實 養术

治蚘九 三稜 莪术 青皮 陳皮希五 干姜 鷓胡菜大 烏梅中 胡椒各二 大黄。中自利者去大黄加甘州。小 送下。若不知者至二十九。 右末作光格子大。以枯攀為衣。每服十九。白湯 治惡,藥汁者此積塊,所致也。 治、姚蟲 ええる一 黄柏 山椒中 C===||英含本素不 秘者加

黃卒加半夏生姜湯 桃仁當歸湯 黄芩五 甘艸系分 吳茱 青皮 桃仁 孕婦嘔吐。且下利者。主之。 二三滴以服。 右水煎服。嘔吐甚者。加半夏臨服。姜自然汁運 右末作九麻子大。每服二十九以生姜湯送下。 當飯 玄胡索 生地 川芎 赤芍 牡丹 芍藥升五 华夏美

胎者母亦必須。此脾胃虚損之所致。而原挾外邪者。 風命。因患此症也予多年療姓婦就中五六人源鴻 日劇清穀下利。羸瘦虚脱。數月後小産而多死胎。死 姓城五六月。至期月。患下利者。脾胃小虚損易傷於 生姜自然) 姙娠下利 者同諸藥煎服半夏瀉心。倍加干姜湯亦治孕 婦嘔吐下利腹中雷鳴者。 右水煎臨服薑自然汁。渾二三滴以服惡自汁 大棗三 · 安台 传 症 杉

醒脾飲子門人 感者宜隨症治之 孕婦下利。人多分利疾與漕泄。雖然原是內傷兼外 及其初若遲則必然落于危篤矣。 此率有少陰厥陰症至虛廳已 手足帶浮腫者雖有和緩將裏足不前故療此症當 厚朴草豆蔻分五 治子利云云姓城下利。 右水煎服。 干姜四 極腹脹肌熱或煩渴。

产用 加味金正散 厚朴 甘艸五 大棗 生姜 斯得效。 腐勝,症本方加禹余量一箋,赤石脂一箋服幣 治一切暴泄漕瀉者。 右水煎温服。脈沈細有寒者。加附子肉桂干姜。 近有一婦門骨虛損腹脹下利。日夜無度漸去 又有疝兼食積者。必小腹絞痛而煩圊。其色白 陳皮 藿香 半夏 著术各一 老さ | 今春春末木

通脈四逆湯 白頭翁湯 論云下利清穀裏寒外熟汗出而厥者。主之 下利下重。欲飲水者。以有熱也。此方主之。 右照常煎服 滑下重腰脹。産前後除于秋季冬杪必有此症 加神麴具菜更茴香肉桂澤瀉 附于各一十美五分 黄連 黄蘗 秦皮多

もさ

(州王) 奇春本亦木

右水煎温服

葛根湯黄芩湯伸景氏

The state of the state of

〇姓城小便閉並臨産小便閉水等

危症宜、在治之。數産或有和癥者多思之蓋數産婦 姓城四五月間小便室塞經時不通者。則致腹滿急

官系必不緊固故宮口下垂蔽塞便道有疝藏者胎

未實被之壓則胎宮並垂閉尿戶因亦不通也宜以

術導之。

陷產已破漿或未破漿而見頭閉塞陰戶小水不通

另有產後波閉術宜然觀焉。 醫坐其股間以右手食中二指人于陰中勾尿道垂 蔽物微帶推送意則隨手溢迸腹滿立減氣急頓緩 際上送其胎乃向本位而鬆通於是施整胎浮漂二 清川 柳欲廣流傳然頗奥妙筆不隨意故舍旃。 何。安排調理之若腹滿危急不得上送者命之,仰卧。 導水之術。命婦安坐醫養背後両手緊當其横骨上 者則見頭逼下。雖以指頭推納。毫不得通爲。余近得 故力息止經三四日腹滿氣急不能卧寢倚几危坐

()被膜胎

娩被膜胎者率在七人月間至于満月甚年。胎孕腹

落地經時必死須敏捷 八破其膜出之若不發聲先 居之狀人多不審故遇娩此者須熟視審之凡胞胎

於成云,此異於常母夫不然,如夫常母。全身取次脫 診臍帶脈其脈相應者可含冷水以雲見頭多即發

從胞而其胞仍在戶內也故偶見之以爲異耳

胞與膜相離其膜裹胎人往往疑之。余性在浪華新 異圖以為如被膜胎胞在腹中。其帶垂下而出人戶。

微脹更無腹腰脹痛而須更產下者。此即生之尤易 孕婦至期身肢共健者。卒然腹痛或腰痛或覺臍下 膜相離八寸許。而胞蒂異常破視膜中見蠢蠢從動 勒街人只衛者妻姓城六月。産被膜胎而胞猶未下。 終死。臍帶至膜二尺許。提而視之。皮膜在臍帶。半 者因圖如此耳。要之生生之變不可執一而論也。 於是始知子啓子盖見膜胎絕少偶見此胞膜相離 **臍下微痛。遂脫下。糸以爲竒。乃置諸盆上而視之。胞**)臨産並坐州術

共悠遠。命婦人努力。氣疲力脫或招不測愚暗可憫 孕婦之心於是洗母等。不辨宮口未開。胞水未逆相 **遲四五日則親屬甚憂之。媚鬼侫佛百方禱禳。却生** 有之。然胞水不迸且無死胎候者不足以懼此症必 也或腹腰微痛延轉引了率是母強子軟初孕者多 裁而辨期不期非無其法雖然傳之可以心而不可 産前腹痛。且作且止名目,弄痛,此症亦初産有之遇 不食或嘔吐。氣逼心下一不下達故陳痛不到。產論等 和劑湯。嘔吐不止者。小牛夏類主之。 老之 ○十七一英岳樓藤夜

以筆也。 必速矣 潤漿淋瀝有一二旬或至五六旬切勿舍惶其生盆 进水者。産論探宮術可以辨之吉內遲速 氣當此時。候之。乃子頭髮隱然應于手焉。 凡催生數淋瀝或每陣爽軟淋下者。公餘泄也。 順臨胞水則一齊迸出如建筑而水色清澄無發發 也產論所謂膀胱之餘泄其水必冰瀝而帶移移至 又漿水冰瀝來小。名日試水非為是子宮開胞水洗

催生已試水或腹腰脹扁。却未破水者。切勿令坐艸。 至破漿一迸腹腰並痛肛門如拔眼中如火乃當今 倦。臨期不能用力。遂招害必噬臍罪容不慎。 送若不知其期而坐艸甚早。婦人用力大過身體困 坐艸兒頭下逼産門自然發努力於是醫宜用力一 孕婦産前心下時時痠痛嗳氣吞酸出食臭或嘔吐 余屢見二三旬者獨宮河氏婢。淋瀝經四旬家人 大懼之。余日。此餘潤也不足懼五旬後遂胞水迸 出最易生母子安健。 (ナル」まるすます

實壯婦人被傷之輕有無害者然百中一二。此余所 心下時時楚痛也乃以濬川、循通水力息來者行坐 其氣逼心下。毫不下行遷延累日。此飲食傷也宜三 **艸術有死胎候者。施工生術** 頭捕横骨因小便不利其氣湊心下。於是力息必止 順正臨盆。破漿而未產已經二月則通腹努脹。是子 物備急九大吐或下利率置下利而娩焉。多死胎也 凌痛隨加下血或污水。如產下候雖然是非陣灰。

效。余有一方附後又有不出白沫而如死者此等症 先舍冷水。既兒顏即必發聲循未也則鳩尾或田樞 免故見伸脚裂膜也。何以知其然若夫皮膜未破漿 須診臍帶動其動和微而漸强者生否則死又一法 頭被皮膜絕無脹滿故知其破决也。 人云其色白者。肺藏虚怯也。按毒盛喘急者。百藥無 水不下者探候之每陣來到胞膜必脹。此症。雖則兒 又有膜旁破决。淋淋水下者。大類試水。此即臨戶不 又有見落地不發聲。其色清白。口出自沫者。必喘古 老之一 〇九九一英名 楼藏林

年。衆人皆知其害奮習漸祛然亦往往有沈迷者。云。 此即于玄翁之所發明而余懇院於人者也我藩近 哉且其理視諸州木。而尤明方其生崩茅。石以壓之。 樹以生之則鬱屈屯蹇雖欲苗然伸暢其亦極難矣。 其爲困弊疲弱率莫不然寧可以此一禁束縛窮苦 苦之以微纆柳械則不病且斃者。殆罕。嗚呼夫姓婦 鎮帶緊紮一、屈脚寢卧彼困弊疲弱之人。而束縛窮 婚婦不被劇害而遇艱産者。率獲諸世俗二禁也。 一 灸一二壯 三之写妻友豆

此古來相傳之法。胡可廢棄余於是深知做獨者難 着之一 (三三) 声音を赤を

革。薩流者難新也。噫。

臨盆探之破漿已迸頂命坐艸陣疼切緊者。自旁助

聚來,乃命其坐艸前置,尺餘小儿徒之頂令洗婆著 之娩焉既施按腹整胎無食傷外感之患者則候破

其背後應於陣夾撑其肛門至會除。産婦此時時脚 尖而俯凭焉。及子頭出戶。醫乃兩手承持向陰門上

邊拔取之置於傍而後令産婦跪坐以息之見落地

即不發聲者。或有臍帶繞其頭一二匹須加意以解

者。四生術以出之倒産露一足或而足。或半身者。除 救産之術。大要在坐艸矣。而其術盖備馬順臨死胎 得者。先用此術。強人好力。胎乃下向即四生術脫之 救之之術。醫既小儿。與婦相面、两手指頭向上。一个按 翼云。娩期已至。聚已被送胎看在上經時不得晚者 頸舉體懸任。醫左右隊頭着婦,小腹醫仍生腰反背。 除之。否則絞其咽、招不产此條頗本,於異而統 無陣疼至。作之。其胎自然下一人門又死胎有探之不 斜,向,下。却,好以掌按不容完左右令婦两手緊持醫不便,於用力以掌按不容完左右令婦两手緊持醫

飲則用釣胞循橫礙必死則施易橫術胞衣滞碍。 天然易産。固不假人為方其有所副。自非勞伎何何 露一手榜得頭者。正偏術以救之。胞衣未下。宮口不 由赫厥靈平哉其術之備。良有以也 倒術以脫之。坐生得,尻肚者。拔坐術以姚之神手産 口收縮。或胞蒂斷截則設脫胞,循抑夫尋常如達此 でヨーラ台を書る

(蘭齋先生死胎辨

五六日。或十日。而未破漿者。生胎也。 擬水迸下而不娩經二二日者。率死胎也雖惟生經

生 催生或臨娩見崩血者。率死胎也力息緊脈浮數者。 一胎也。 催生不論順逆血塊磊磊下者死胎也。此症雖作 不知其期者。陣疼緊密如產下候此其期也問 艸術,姚之。婚未也,則行,回生術○醫知已破漿。而 可知。因考距期淺深判胎死生 而産母氣力。必不衰也。虽死胎。而有陣疾者。用坐 循有生者。兒弱則霎時而死。○若生胎經二三日。 惟親窃按此辨順臨難娩死胎見處則迸凝一日。

胞蒂先出者。率死胎也。臍蒂與血並下者。亦死胎也 力息陣爽,並漸止喜眠睡。脈沈遲者。率死胎也。 死。 陣疼數者。生胎也。凡崩血症。見軟弱而失本位故 後患。 胞蒂先於胎而出者。横逆之類也又有神手產而 力息而於血將下。故有死胎後若血見其血少而 胞蒂先出者。生胎絕少破水後即娩之則胎多不 血脈動也獨宮中畜血下者以術娩之母體必無

並出者死胎也。 胎不疾以術娩之轉移間變為死胎。其手指與胞蒂 横産露手至膊者。率死胎也。手指獨出者雖或有生 後輯緩移時。其脈沈遲者死胎也。凡有死胎徵者 喜眠者。有氣力渡嶺狀以術分娩即覺錐然破漿 須以個生術敏捷脫之。 脫陣疼間。生眠睡者。然未被漿者。生胎也凡生胎 此症為生胎催生雖然庫疼不緊喜眠睡派沈遲。 一若死胎然此以母力渡蘅也又有難産母力頗

横産先露手指若肘者難辨死生然子頭神手

背或肚腹者以易横術娩之否則忽為死胎毋亦 有生胎手獨出者即横座也凡横座探之得版或

至危篤也必矣

逆産兩足出。而不娩經半晌者。死胎也。 逆産已破漿出半足或両脚者若不速娩而両脓

或頸腦礙者忽為死胎須疾以抒倒術出之術。具

産

姓娠數月脫血者。率死胎也古人謂之漏胞大半母

腫病。八月至期不流産者多生胎雖然務腫大滿而 姓城及八九月。患水腫病而傷產者。率死胎也或水 無害不腹痛而脫血者。处有害然胎漏下血則或 無傷干胎。 者。多流産也。○又有比及八九月腹痛脫血者多 姓城二三月不腹痛而漏血者或不害于胎有漏 未至姚期腹痛或不腹痛而。血下者。死胎也偶有 安娩然可懼產毋音聲吐納如常而多竟弗起 シミ ローを 下腹を入る


氣急息迫者死胎也 之ঙ腫大滿而氣急息迫者。死胎也。凡難産生胎 衰耗而不能驗之故率成死胎此不特水腫病諸 輕,她後必劇竟致在忽須切辨之 也則姚後母病亦隨愈矣若水腫病死胎母病似 **獲腫而其胎無恙者以不侵於病毒也雖至期保** 病毒劇因臨胎者死胎也。凡死胎多必促母命。今 母氣強比則能飢其胎若病毒深侵內則必母氣 獨舉水腫病者。記其重而已。〇七八月至期雖上 〇二十四天白芍源心


第一和劑湯 物備急先 附子 當飯 産前後此方主之 卒然腹痛。或嘔吐思心。或飲食停滯者不拘於 右以水二合半煮取一合半。服之 催生婦の分論虚實寒熟通用。 治臨盆其氣逼心下。不降下腹惟生遲延者可 白术 干姜 芎藭 黄芪 芍藥 茯苓各五 桂枝卷

巴豆去激 烏藥場。即此心下有一塊。按之輒心又脈左備有 六脈沈微而數腹堅確如石。余曰。此胎已死然必 腹脹痛遂墮胎而瘀露一滴不下故腑下微痛與 **造與茯苓澤瀉揚。服二盏許。吐益劇水血微下。腰** 而飲食人咽軟止既五日大勞疲繭質於死診之。 買人清右衛門妻。姓城七月。呕吐下利大喝引飲 動坡之輒漏是動隨唱貴上而逼肋下強按下於 右為末。糊九。菜豆大可完服 大黄 一美各等 三土五一英名樓藏林

之。嘔吐終止余以為此原傷食而嘔吐。故腹內空 欲食也作香砂六君子湯加枳實服二貼便飲吸 稀粥而漸甘食六脈復素夫姓娠因積聚而數月 力。殊思食臭盖雖是病和巴去而胃氣虚耗。故不 白虎加人参湯於是喔渴並止利未止脈遲而無 附子梗米場。此終止疾服二貼月身發熱脈浮而 與三物備急十二九如按其動吐半減脈沈微與 虚亦凝聚之而動焉。每動輒嘔所以胎亦不育也 數頗有力。明日又大渴。欲飲水數升。舌上自胎與

産航卷之一終 嘔吐者。必不害於胎今五日而其胎死隨故知此 原傷食室中氣而胃氣不運於胎也嗚呼甚哉傷 食之害於胎也 等 我 我 老之 〇三十六一英名精雅和





飫肥 桑原惟親敬夫 著

〇 發 癇 論

或日。好孕七八月至大期發癇者此原體虛受風。而

傷太陽之經絡後又遇風寒相搏發也則口禁背强 痰延壅盛。昏暈不省醒作有時。謂之見暈又曰子癇

又旦痙甚則角弓及張或曰姓孕中風名子癇因體

故治方以小續命者大非也。產論云。其人七情變結 薄受風寒一个按此論。並以為侵於風和而癇痙因同

生之最多及

府是爲子澗故其病必右異云。此症多有燥屎者。又 太甚則內火煽盛熟薰大肠怒禪慎起。上動委食之

云。有平日多好。夫妻及目。怒火熾盛。因發此病者。蘭

齊先生曰。平常沈黙婦人,因,佛鬱而患此症,三說大 同小典。余療此症不下數十人其狀頗相類雖然有

下利而發者。則不止有燥屎者或怜倒和偕婦。亦病

之。則難必鬱結多婚者也其他人人聚訟不暇辨析

窃殿之大凡二三日前。目視瞧瞧而頭痛惡心。痛恐 飛祗是上逆氣痛。此將發之機也其脈或緊或弦臨

發必嘔 吐。頗類停食症吐一二次。食物或苦水。既發 由此観之古人以為屬五臟者。似有理而未審為何 則振手際萬天吊直視。口出延沫身攣急或右或左。 因何經。蓋目視瞧瞧不省人事播搦學急此皆関肝 經者與尚俟大方明裁, 之則不復發困困然如睡翌日申牌居然始死胎 不過折發勢更作單甘艸煎與之學急即止頻服 學急天吊。搐搦煩躁一晝夜因投數方兼施牧術 會一婦人好學八月。食熟柿暴泄下利。卒倒不省 一 上 上 上 上 上 大

老之三 二一一典色有影花

此婦卒然發癎更無前機。余未且擊此類

好孕發調十八九死胎也方其未醒候之雖宮口開

難辨陣疼有無切望之有其狀如睡面赤小。見力息

者。此陣疾之徵也是時推導胎於下腹則必晚痼亦

造止或娩後歷,數時,再發者。多有烧眉之急。甚可思

發癇中自娩者。盖鮮矣可候宮口開以, 田生術脫少

舌危篤症也異云。發癇吐舌者不治 又有一種其勢較緩而鼻出沫可吐舌死如小兒弄

發癇分娩者。醒後尚目視不,瞭然此余所歷驗。

發桐婦人。今其仰卧門者其左邊而起右膝足踐其 拘急其畧相類者特學急耳。餘則自别。 **席脚擊急必、斷齒癇爲病。昏暈不省天吊直視。搐搦** 竭而内虚因致之也。此其大凡。然難偏執 或問。孕婦有癇而無煙何平。日。班孕內實所以無煙 叉問癇痙之别日要畧云。痙爲病胸滿口噤郎不著 因致痙又云夫風病下之。則痙此謂汗下過度津液 病大陽病而內虚則痙。仲景氏云。太陽病發汗太多。 赦癎術 傳編與美以致年齡言等即

老之二

左秋令體不得動右拳當肋下拘急者而被抑之左

手指頭鉤其右脇皮叉以左手盖右拳甲。一齊用力。

術候宮口開以分析出之一不出者。更行四生術大凡 折上慎势噤齒隨開即可灌藥發癇剔者先處方施

及晚間亦乃止。

單能膽 初發癇者一切主之

熊膽一味。一二分熟湯和勻領服際齒者以曲頭

管灌下。

三黃加辰砂湯遊倫第二和劑

甘艸半夏湯 姓孕暴泄下利。天吊直視不知人事 甘艸善 半夏十 黄芩 黄連各 大黄 黄芩谷七 右照常煎服 一葵一切治劑成效。 右照常水煎去滓。加辰砂五分。攪而頓服劇者 曩遇下利發癇婦。初以苦味不治。乃以"単甘煎 只出涎沫癎中尚下利無度癎更不止者主之 先以術折慎起勢後以藥宥病力。 黄連五

一人者スニ

ラチを引え

奏,可仍今此方亦甘艸為君當於浪華得之書

備後試

傷寒論。甘艸鴻心湯症云。傷寒中風醫及下之。

而滿。乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡 其人下利日數行。穀不化。腹中雷鳴心下痞硬

復下之其落益甚此非結熟。但以胃中虚客氣

上逆故使硬也。此與甘艸牛夏湯,方症並相類

翼又有多連湯。使用已久大抵以苦味抑物急。 而循未則還以甘味解之。可也雖然疾非一

刀丸 抑肝散 妊娠七八月。氣不舒快時眼斜口陽。或目 水銀三黑鉛一辰砂兰金五雞兒石子 柴胡 芍藥 白术 茯苓 芎窮分二 法非一職多多益辦,此醫之能事。 右照常煎服加辰砂三分光效 石水銀。同黑鉛熬合。稍寒。而後三味和**匀**、煉密 視瞧瞧頭疼者。此發癇之機也。主之。 發癇諸藥不効者。投此方。 釣藤鉤 赤箭 姜醬各四 甘艸 當飯

オーベー

為九三分先服其一。温酒送下。思酒者。用白湯。

不愈則尽一劑類。然不如此兼用諸友尤愈也

單末方 永即水銀也。

冷水送下。莫不愈者云。但余未試。姑備一驗。

〇<u>産後</u>發癎

某氏妻。始身二三月病阻不納食藥至四五月時

時腰腹疼痛下利下重因大虛贏余以為今有此

利此亦務所致也與主附屬此利漸減母力漸

胎稍實長期月易娩後九日一喝猝倒家人驚劇

天麻湯三黃湯熊參類不一效余意非是苦藥之 湯脈數而臍上有動更與妙甘艸湯而漸漸復初 此婦天那道視產急于左而無背不者席齡齒症。 發後雖醒而不過天吊牽急止與備急參連沈香 故知非經地全醒乍發發則脈沈醒則脈浮。且五 雖然時時愁哭轉方一服忽然牽急。因又服甘艸 所適乃作甘州濃煎服之勢稍寬鬆至翌午漸醒 引余天吊直視顏口牽急于左脈沈而數急左臍 伤有一緊急。如柱。或疑是<u>經病。</u>余日。痼也。叩之。可 たるこ つに「正くら其を比める

甘州湯治一切急迫搐搦上寬者 えるべ 一支全村非本

甘州一两千金

後の大き子のはこ

右以,水二合华。煮取,一合。

炒甘艸湯 論日。脈結代。心動悸主之 麥門冬伴 麻子仁片大囊 十二 右照常煎服 甘州四两生姜 桂枝郡三人参而生地黄广阿膠二

甘艸芍藥當飯大棗湯 治産前後通腹拘牽或急

甘艸 芍藥 當飯 大棗 右照常煎服

吞下者。以術開之。循不、得開。則以曲頭管灌之。 重者大承氣湯類率非汗下則不能治牙關緊急不 終必角弓及張異錄循而不錄方其方輕者葛根湯。 床太早。以致外感身強。角弓及張。名曰。蓐風此即痙 或曰風邪傷太陽之經絡後又遇風寒相搏曰子癎。 也經之初發腮頂強而能言漸牙關不開不能飲食 因致痙。李延日。産後一月內不可脫衣洗浴。强起離 叉日痙此說混同不别。仲景氏日。太陽病發汗太多。 つければいたは成人

○痘病并術

河魚 浪華平野街一塗匠妻易庭後九日洗浴其夜腮 えるこ 〇七 安告村 湖本

經数日。復延余日前婦雖延數醫更療而其症益 項強急明且最劇來請余以其街中多醫家讓果

雅君。性,視之。禁齒,背不,者席。一見判其痙也據張 劇。非君則無以托化生為死亦唯君。変枯為榮亦

氏治之。不出數日霍然其喜可知。張氏儒門事親

云一貪家一男子。病被傷風搐牙關緊急角引及

張。票之空室無人問者。時時呻呼。余憐其苦以風 藥投之。口噤不能下乃從両鼻竅中。灌入咽喉。約

生之年。皆先生之賜也。先生即發余從焉。一察之 走做手待死而已。若台駕賁臨以妙方見救從此 澗即不者席一晝夜衆醫溫投有加無愈遂成却 啜之。汗下周匝如洗不三日而產,其書有,主 開尚未能言。余叉以, 主支麻黃湯三兩作一服使 京師買人某一日來請贖齋先生日。鄙女卒然發 一二十行。風播立上,肢體柔和。且已自能起了雖 中機死中求生。艮久上漏下泄吐且三四升。下 景氏所謂各半湯也。

者之二

下私余日。此痘也因小產而發者耳。今血臭撲臭

其符顯然不蔡可下。而渠不之告必有以也余乃

招其父於間室語之。乃大驚。舌橋然不下。良久日。

精哉先生之為醫也。鄙女今年十七。好孕五月。以

未許嫁。恐引風声。故編脫之藏頭沒尾欲滅痕跡。

先生炬眼。一見洞燭露出馬脚何以得相瞒乎願

少垂。哀憐先生冁然。作大承氣服之一時許而下

素其父以手加額謝再生之思。 泄一大利。困困安睡。次服大柴胡加石膏三日如

與四指。抑心下學急者左手及膊用力。而訛其勢是 其術先令婦跪坐者既及張而仰卧或側卧。醫者其 以不得反張乃可令服藥若未柔和則勿伏衛 右邊左手喻其頸上而指入左腋下右手則析拇指 張氏風藥 大黄美二 股本書有,藥味。而無 **座病。或破傷風。用弓及張。時時呻呼者。主之** 右啖咀三分照常煮三味。去降內硝石炸消頓 甘遂五分葵 牽牛子美二 硝石 まらまえん

声角

大承氣湯

齒可與此方。

金匱曰。痘病。胸滿口噤。卧不著席。脚學急。公齡

大黄 四两 厚朴年 斤 矣 **枳實五枚** 芒硝三

右以水一斗先煮二物。取五升。去澤內大黃煮

取二升。去岸內芒硝更上火微一二沸。分温再

服。按厚朴獨多之大权

大柴胡加石膏湯

切痘病主之

推坑 桂枝麻黄湯張 官桂支七 桂枝 大黄和 半夏 之。 右粗末每服三戔水一鐘。姜枣一同煎至七分。 一及張身強解後猶未柔和。候之。表證循存者。主 右照常煎服。赤池者加芒硝。五亦可。 **芍藥** 甘艸三奏 大枣,斤 柴胡五 甘帅个七 生姜介二 黄芩 芍藥分三 杏仁二十 石膏十 伏令 部 麻黄 松實

英名核弱科

温服汗出自解

倒生

産論云。倒生其孕本亦背面而上首。故其生遂自足

臨産遽變者妄論耳可謂具有特識矣余每遇倒產 題而出也盖古時未知其胚胎之初所已倒錯而以

游殿者顿據其手法奏功特多而其處足不必**倒**產

不出者。余性年殆誤書備後鑑。 宜于細之不然則很引之有難足踵斷人戶破而毫

有一處土來請曰。賤妻臨盆露足踵。已一日。毋力

膜裂而手出者。神手産。或横産也露足踵者的産也。 膜而得如薄絹包一小物非手則足也即爪破其膜 如順路已破漿雖經一日有未死者。倒横二産则經 余每寮倒産及催生陣疼膜漿未迸者。探之戶內間 関眼直執兒踵以引之嚴然不下又强引之唯母 而下。奇哉右足踰於頸頂而露足踵者也此類雖 體移下而已於是極意施工生術的內始隨手力 日衰十死一生敢仰勞駕往視之。母精虚耗不能 か計画を記述が

老之 男名枝輔村

足者神速技之。不可失機會不然則必有及水不收 一一時必為死胎故倒產未被幾爪破其膜而見見

之悔。

持倒術

開股而重們其足大指審辨左右得左足者却索右 倒生。採之子宮外。得見足踵者。今婦侍棒高枕仰卧

足得右足者。却索左足既齊得之。乃以右手食中無

無傷而後醫起腰據膝頭用力急拔之。乃分娩矣如 名三指股間捉左右足跟左手則抵人戶下邊傳之 骨不出者當以綿衣裹見體左手緊引之而從陰門 醫未至子已露一足見膝若股髀者。此多不復得家 綿衣裹之而露左足者以左手從人戶右邊緊引之 左右而齊之緩則母不勝痛苦多致禍馬唯當疾以 以右手探見右臂。出之如前兩臂已出頭面仍拒橫 因以左手次中二指鉤髀灣而出之通腹皆出兩臂 露右足者。以右手從左邊緊引之於是髀灣近人戸。 嚴住者可緊引之而從陰門下邊人左中指探見左 肩膊循膊而索臂灣。鈎指頭引之臂乃屈折而出**又**

得分娩矣論及異 下邊人右手中指探其口魚乃以指頭鉤口中。稍緩 左手。而右手則引之於是兒頭俯出用此術者。鮮了 時候諸戶內辨其手足得手指則却索子頭審其正 碑手產者。其產順臨而雜手於子頭也當陣疼破漿 出之若子頭少偏者。先推納兒手。整頓兒頭傅其正 偏子頭已正臨而傍得手指者即是也須以坐艸術 臨而後可施術其產必及破漿臨盆而始有之。如橫 神手産並横産 老之一 十二一一一一一大

精虛脫陣疼亦不至。露手或得背之類。雖用左手指 其胎自移。腰脾或兩脚或一脚出而不假竒術得分 娩者。是天禀壯健。且運命未盡也可謂大幸矣。如母 放之余曾鼓之覺其未精偶有壯精之婦陣痛衝劇。 脚間入鉤其體引之其脚乃出若不出者。依四生術 指頭推轉上送之得其腰曲灣處內用左指頭從兒 產有探得其背者。須令婦高枕開股仰卧醫用左手 不得寬潤自然其胎歪斜及期機卧產門也裏曰情 産則自妊娠中。已含其機所以然者鎮帶緊紮腹內 か会へ

もえ

頭推送之而未見有轉移者也論曰遇横產露手。刺 コニョラきすずノ

去之則可得救余依此法而誤者數次於是反覆精 考更得一術後於蘭齋先生門復得一法。合其意與

余手法。名, 目易横術施, 諸衆婦, 随地有功, 其法願奥。

自非面授則不能了然於筆頭然非秘而不傳也君

坐產附循

論曰有採之得子醫尻者名曰坐産盖於胎內醫坐 而腿灣上折脚着於腹脚尖却會順下至期乃應陣

領故男子探前陰睪九以知之或無論男女。探後陰 股竪兩膝醫坐其前以右手探之得勝尻者或誤腮 者又有上首者因洗婆之誤而爲坐生者若夫腿灣 葵而臋尻先下者探得之即是也又有倒孕上首而 法須強伸之裹以綿衣令其不上抗每一便通戦換 鎮帶緊然至期尚不解之是以脚不能伸廢尻先出 不疾出之。必易領命其法有二。先命婦高枕仰卧。開 綿衣。如此而經數月則免為不成人矣。此元倒生故 上折而育者。晚後多仍難伸而際頭亦不屈治之之 一大小 の上は一支を表文を

 为 为 以粪通知之。於是待陣疼至以左右中指。鉤見兩腰 老え 〇十四一支会を死を

曲灣處而可應力息左右遞引,及見腰眼出醫乃以

綿衣引拔之。如丹倒偷看。風精怒。施此難娩者亦 右腿而拔一脚一脚已出又拔一脚两脚已出裹以 兩手。持見兩髀。強引之。八形已出以中指鉤左腿或

令婦仰卧如前醫坐其股間監左膝左手抵人戶下

邊以右手食中二指入陰中強進之至見股間探其

施用若夫死胎經數時。胎高而遠於人戶者又有法。 左腿灣而引之。左脚已出又拔右脚此二法。余每所 胞者二一在雙順一在雙逆比諸常胞其形稍小曾 盤。是學胎奇者。余見學生凡五十餘産大半、陰陽胎。 是學胎正者或雙首向上或向下共一胞胞皆大如 腹面却不又日。一倒首向下。一、竪頭向上胞衣各一。 論曰。任脈窪成一道者為學胎候然此惟五六月間 而男或先出或後出所謂一順一逆者。僅見一婦而 見之至九月則隱不見。但腹左右大脹。狀有稜角。而 胞一帶也其餘則雙順雙逆而雙順尤多見各一

孿生 附析

范舟 起者。 驗之。任脈窪成一道者。有無未可必而又有前腹突 太劇懂二三至生一男續復生一男而一胞與後 得側卧熟眠者。已一月餘勉強感卧忽覺氣急煩 生並下。奇哉二子小大均整難爲伯仲矣少問血 悶。余私語其夫日此學胎也。且有水氣其臍不禁 浪華權屋街一商家妻好八月前腹脹起如抱就 解亂。是內水。後必有殃雖然産則易矣至期陣扁 無數理整然有輝其脈微數時口有渴婦日不 者之一 (十五一大名村前也

後娩惟生多必有力息陣疼如胞衣將下。唯臍下微 者後處同胞衣。而但中一薄皮。 脹崩或覺人戸突出耳力息陣疼則必無也然或有 而言之敗此亦難心雖然如一順一逆順者先娩逆 有以左順右逆為學胎之凡者。豈以陰陽升降之理 大下。煩懑擾亂。余日。此崩血也須急令之侧卧別 此不復可說也乃辭去翌日果以斃告。 每産如此未曾有害莫煩較念余以為其好所至 有救法不然命在呼吸矣再三然德不可口削婦 う十六三支兵療変災

害亦未可知。故後生則稱胞衣胞衣則稱血塊 後胎未産或疑於正産後有水氣者大抵按腹判其 臨期。雖知為學胎勿俾婦悟恐其羞慙而發顛暈。招 肠腹以右手微叩左腹其動應左手下。應了有麼者 學生之胎、比常稍小。大抵如七八月之胎若胞衣未 产州 水氣也。 是否。尚未也。則合婦仰卧醫者其左邊左手抵婦右 下者試可引胞帶引而不下。則察腹內虛實而决之。 無其候而娩者宜精察甄别 着え 一一一八五本が水

4

或曰。學胎生死準於先娩以余所觀如一順一逆逆 雙順雙逆或各一胞又有一胞而一帶二支者。 法宜編其手足為胎居额其寂然也速於稱遼來矣。 雙生一齊發啼則婦人不啻生心或思證譁。止之之 當此時。婦人不勝酸楚只欲免於厄故雖學為孿産 術。如挑新菜 不遑羞慙自刃無妨。 一胎一胞者。其大倍常胞。而必二帶也。拔之以鉤胞 一順一逆而逆産後生者滯礙則可以抒倒術拔之 N. W. いいには子は成り

産後出者滯礙則獨逆産死已。亦難一定。 えるエスニ 〇十七一英名村 神本

舉學術

舉學之術。客備於異中而其言曰雙逆産見兩見緊 **尾者。尤數產也其施術依疑不決。必致于毋雙斃余**

農遇此症の今婦仰卧坐其股間探之。曾無相競力

於是左胎繼有競勢。乃以叛坐術出之。且將息以頃。 勢。因以右手食中二指入,除中,而排,右胎放他出地

死出則得全又有一兒手。一兒足一齊露者其法亦 而以整胎補處後胎於本位亦施拔坐備雖雙見已

受胎在後。故所處亦追所以先娩如後娘者及是故 逆者各有一胞於是立前後受胎之說雖然一胞雙 競出未被水者。爪破被膜可也雖然分行者甚至 後娩多滿月之胎。先娩多未滿之胎。二子謂一順 翼曰。凡雙胎。一順一逆而其先娩者兒體必小。以其 阿两股者。法同生胎\新首。余日。左右外行而死者。施· 論曰爲首向下。胎已死於腹中,分行而並下其頭各 四生術,生者行整胎,術傳,一胎向人戶必陣,扁至而 見異中。不載於此 の上記を表文

が着之二

产品

脫者。亦胎有小大故余以為一栗縣仁。一宮學生本 〇十八 英名福港

是一理果有大小不同。八子獨不然哉盖皆山氣之 歉足已。然則小胎先娩者。何乎。日。小者易出故必為

之先亦非有他也

崩血並遏崩循

異日。凡卒暴大血脫下。名之日崩血其因有數種有

後緊束鎮帶仍起步就椅因致之者又有發嘔吐。軟 分娩後。産婆欲下胞强按腹動血因致之者有分身

血大出者。今按其證有二。如宮中有畜血者始後或

側即醫倚背後。右手抵右翳肉左手按左臋肉而左 產罷須察草上漏露多少其血大脫下者。便令婦村 異日胞未至。而崩仍發暈者尤爲極思候。余日臨盆 流而下。色禄紅。如金奢箭血。産後不異平素而忽然 經閉或小産率皆脱下其色深黑此則不足恐也尤 未婉而崩或小産其胎未遭而崩者。並為極惡候凡 實婦人。少頃能勝此者。余有一術舉于左方。 面色失紅不知人事上寬一喝而死者多矣若夫此 可恐者。精道崩血。已產婦有故而動血血從精道崩 张行本,以

对 参者膠艾湯 之。以救虚量必勿緊按更以左手中指從後入陰中。 則行此法有帶者可解去主方參者膠艾湯。 側即醫就背後而坐右手從左肠下進心下輕,按 屈指頭以塞精道口於是脫血頓止施前法不遏者。 黄耆 黄芩中甘艸少 一法精道崩血其色緑紅而發虛暈者速令婦方 一齊用力緊合此手意要閉陰戸而傳脫血畜停 阿膠 艾葉精製如綿人參韓庭白术 治虚弱婦人精道崩血必發虛量者。 老之 十九一英色標旗を

以塞尿道而然其一。子宮追下便於便道此二症此 異曰凡思此者有二種其一。臨産兒未出産婆強按 其腹腹內子宮與兒胎相軋子宮因致傷腫起張墜 産後小便閉並洩閉術 效。 下血過多者。何症此方主之。若脫血中有渴者。 不嫌於其脈微信加黄本。加石羔粳米。煎服神 便一宿乾之常貯笥中臨急煎服凡婦人前陰 右七味。去人参阿膠其餘五味。浸一二歲男子 一選 村 田 生 た た こ 起行造成

誤也。余有三術其二則已出導水部其一令婦仰卧。 即着。令,高,枕卧。 臀就其右,整膝而坐左手覆婦心腹滿氣急,不,能,仰醫就其右,整膝而坐左手覆婦心 已焼客口循不復本位而梗尿道不必皆由産婆之 是惡露下少畜狀為塊因子宮張墜以壓尿道小水 未滿開而强命之努力。故子宮追下。始後乃塞尿道 因雖異其候則同蘭齋先生日。此婆子不知其官口 八九多易産也而其不属諸産婆者亦或患此然則 不通耳。按為塊者因有寒也。古又有冒宮胎者雖幸 而不通也余會驗之。所謂子宮追下梗便道者十居 **港**之三 〇二十一英古想前份

此法亦據於二子而婦人卒然蹶化或顛墜因致的 横骨上。故取效難必。盖用前術可有效已。余曾言器 蘭家所用葛帝的兒。最稱善。然其子頭墜下者不及 之其用力比左則十之七分也於是尿道稍寬小水 水氣之逆衝也故左鎮之。欲俾宮復本位也故右按 小如藥藥不如循然不可偏廢唯其當也。 下。右手置横骨上際。起腰張兩臂左右齊按之。而恐 整胎術 ~ 给到

声舟 體見頭初離右腿根痛亦較減醫乃醫坐而伸右足 後。斜俯而臨其腹前令左手懸醫背後乃疊兩手頭 令其仰卧內廳上猶不去左手,右手則承其肩背引 火急趣于其地就婦左邊而坐竪右膝隊頭貼其背 動。甚則子頭倚著右腿根難勝楚痛不能起行者鹽 則痛止而可起按右為事法如此若左偏者。其循及之 承翳尻而向推其胎乃移本位也於是又施浮漂術 取右足。令其仰卧草茵上。左手鉤子頭而前引右手 而鉤子頭且以所鉤右手肘與所貼右膝頭揮塞其 三二 英本村亦

浮漂術。使其輕浮於是腹內寬於自無帶礙尤可忌 必不出五日故疾施整胎並浮漂二術次行安胎法 孕婦蹶什。或顛墜者多乃胎動而即隨或雖不即吃 者鎮帶也切禁之 以兩手從其兩肠向背後又以兩指頭分夾香骨等 **妊娠五六月。至大期,時施整胎貨。其胎得中正更行** 凡施此術者先令婦仰卧醫就其左邊竪左膝聳身。 小然而及,經若水下,也雖有法術無如之何。 浮漂術 THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED I

定角 勒向腹前相聚作之數遍第六手法。次左手掌當婦 邊兩手又持其體左右一柳一楊至章門邊用力束 十二三推而按抑之使指骨節間有聲下至十六進 左章門指頭向腹右手掌。當右章門指頭向背。而左 故名曰浮漂循。 其位腹內如無物所以然者。其胎輕浮鬱氣大散也 右互按漸按漸下至横骨上際亦作之數遍胎乃安 〇十二支行樓敞

脱宮

脫宮有數種一,産婦不知其期而強努力因致之。一、

御令努力。或強按其腹幸而雖,然宮尚不能復本位 色灰白若子官則形圓如曲腰勢有口向下其色赤 翼曰。臨産時候未到。強令努力。因致腸脫者若不早 多有之 也一、數產婦精氣耗盡而娩後脫出也大凡不出此 在難産洗婆安令努力。因致之一冒宮胎者不知其故 納則乾涉難入。以成終年之患。又目。勝大而無口。其 四種然産婦不知期而努力者與洗婆妄令努力者。 而有灰白横文或目子宮兩耳有稱卵巢者而有一 2年上二族 野樓成

宮脫盡者。形如及覆裹底而淡灰色帶薄紅者即宮 官口。口外則門四周也其間無毫隔絕者又屢視子 門則官皮端也而精尿二道深於陰戶二寸許與有 竅不獨有下口者余曾得大猫猿願属 網體 視之陰 此類乎。余甚惑焉若傳屬脫出則宮口上中界好處 此術令婦仰卧醫就其前以海羅汁塗所脫子官以 之裏面也又有陰內餘皮脫出者所謂腸脫者豈言 必可破裂然則其命急於焼眉矣恐不止終年之患 老之一 〇十三少名を亦木

是能此 壹箇卷當腰下。以今又身飲後欲小便者以襁褓母 之納諸會陰已入則以右手次中二指向横骨上邊 斬尾煎 燥者温以鄭尾煎稍和柔而後可施術。 陰門上而通之勿令強通恐有再脫凡其歷數日乾 指入三十許乃令其緊合兩股而以綿衣紫取小塵 兩手指頭徐平約之而向陰戸乃去左手右手則撮 當歸尾 右一味以水三升煮取二升。去滓以漬綿衣。比 是是 小年十日 一起一种建造成

酒 角 角 異日娩後有胞衣下後被膜尚遺陰戶外見其端者 試展之得展開即被膜之遺也余驗之。除戶不異於 常遺膜則狀如糯絹而灰陰戶大異於子宮即拔之 大疑於脫宮雖然是娩時子頭抵觸因致陰中破 而無害也婦人率不知其故大生疑懼宜丁寧喻解 餘肉脫出 脫膜遺於陰戸 比温之娩後倚產椅兩脚麥痒者亦用之有故 も之一 (二十四一) 我高村游人

能此 燥不易復也宜以斬尾煎蔥和之稍得温潤頻塗金 液而可施術。 勿論男女。施復術以救之。若長出飜花經數日。公乾 飲之復脫須以麻絲緊禁每日緊之數日後自然腐 断必勿下刀。 凡脫肛。婉時强努力。或痢疾裏急後重劇者必有之 而皮肉脫者耳。大凡子宮脫者則在中肉脫必傍出。 院肛 復肛術 長い二 小年十二年 許壁境院

引患者命之仰卧應勢以右手指掌押之則復焉然 於柱醫就背後可以漬湯綿衣。押入脫肚乃復 因脫肛者因便秘硬脫者潤腸光因裏急脫者潤腸 如飲宮法而後令患者抱柱而立着鼻及腹足指外 此法要左右一齊為之否則不能復又一法然和之 又有此孕大便秘硬或帶裏急氣欲利不利屢上 至無名中指則漸入門中而左手均其左髀骨早手 兩指逆手持之帶推肛門意先以小指握而約之次 令患者右側卧醫就背後而坐塗金被以右手大次 C二十五一英為模勝移

能此此 論曰胞衣未下。而血量。難治者。十五六。先治血量。後 傍人按心下。醫乃以鉤胞術出之。手宜敏疾此証雖 潤陽湯 湯得快利則不用術自然復潤腐先方。見姓 小胞衣但暈發已過二時者死今按凡發暈者即令 并治之。 當歸 産後昏暈 右五味。照常煎服。 産前後便硬腹滿脹扁或因便硬脫肛者。 をかた 芍藥 黄芩中各 大黄大 2年上二美野勝城灰 甘肿少

属難治其脈洪實或因積氣而量者未可懼而其脈 〇二十二五百七九十十

則死然亦有胞下而忽然醒者。故死中,我生寧脫脫 必塞 工精察施術若其言語錯亂而煩躁者胞不脫

可也

熱陸而搏也按此多積軍也然亦有處量故不得 义曰産後不起則不血量今雖不起而發血量者血

概视之。

也其仰者。血熱氣與食穀相搏也按俯如欲眠而不 又日。産後血量其面俯如欲眠而不覺者元氣虛之

給如石·遂作,挑動,上下近胃口則發悶眩,其說頗長。 通因昏沈不省者是大危之證其頭必備二、血室素 氣已轉成,**尤炎勢以挾**腸胃汚穢上,升胃脘閉塞不 覺者。多積量耳。故不, 崩血者不可謂之虛量也 勝胃動摇筋脈相牽以致血氣擾起與食穀相搏堅 啖而分娩後誤信庸醫欲跪,坐産椅,强起就其處因 虚與食穀相搏。上過心胷。故發運眩三,產婦壯實健 畜鬱熱其為氣甚剽疾而遇新産腹內大空邪乘其 叉曰。座婦發昏暈者有三二,其人氣血虛乏産後大 一地立江 り七七一終時患以及

今舉,概累耳。

蘭屬先生日。暈有三。日虚日實日食是也胞衣未下。

步而倚高枕。或産椅因動血脈血忽崩下者名 量。必俯頭如睡其脈沈遲如此者用禁術則却招害。 婆欲脫之而猥操腹或胞下後令婦即時從草狀起

其下少。尤可以危血黑而腹漏者。麥物也雖其下多 須觀下露多少與血色。色如破傷箭血者真血也雖

未足以懼。按真血崩脫。亦有腹痛者。大便秘結而娩 後妄束鎮帶爆屎與子宮博。其氣鬱塞因以發者名

其二也實暈尤鮮虛暈者勿以禁術按心下實暈則 瘀露不下。因上衝發暈者也**食量**。亦懷痾之所致崩 血虛眩者。參者膠艾湯及遏崩術實量者七味放惡 按晚後昏暈。因疝癥懷病而發者。十之八九。虛暈則 診者精察勿誤。 黑。而諸症互發。 强食軟滯以故娩後欲吐不吐因胃氣塞作卒倒名 而止雖臨盆時至尚不去鎮帶其氣上逼不欲飲食 日食量。熊膽一分拌熟湯。今服必吐吐則醒二子說 質量。日奉急于右身亦及張于右凸施禁術隨手 送り の年人一起に野野戦及

湯。或酸枣仁湯。四肢厥令者。主支加附子湯之類可 易因懷病昏暈者。參連湯。及禁術。未醒者。芍藥甘艸 三十二英名传说杉

也。参者膠艾湯。

七味放惡湯治瘀露不下。上衝昏倒或産後惡露

不下。臍下脹痛者。

烏藥大主支 桃仁 牡丹 延胡 玄牛

茯苓辛

右水煎適寒温頓服若血量禁齒而湯不下咽

者以曲頭管灌之。

参連湯見前 能性忧 産航卷之二大尾 酸枣仁湯 **芍藥甘艸湯** 柴胡 當飯 芍藥 氣海。卒倒或因如夢覺腹痛者。 左腸腹构急暈倒者。此方主之。 甘艸等 右二味煎服 酸枣·大鉤藤 川芎 芍藥 はできる 治娩後腹內空虚殯氣跳出逼中焦 能参湯亦可 白术 右九味水煎服 茯苓 0七七二 終許勝城及 甘

附錄圖解十有六樣

身岳巷亦才

則屬胞。

此皮膜破之蓄漿出。

A. San

狀

是此 其帶垂下。而出人 膜胎條宜滲考。 右二狀其論詳被 被膜胎。胞在腹中。 戸。胞與膜相離圖。

下圖。 察之子頭能應手 順孕倒首背面。按

能上 之八廖丹圖。 是則子頭頂當一 不應手。故疑逆孫 順孕而按之於臍 下横骨上際子頭 11 mm うとした一年の一年の大阪友

Cilt || 英香精頭松

著於腹脚尖却會 是也。 坐而腿灣上折脚 順下。至期應陳爽。 能比此 而臋尻先下者。即 坐產腹居圖乃醫 IN THE ME の上二年行と成反


當破聚時候諸戸內,順臨而碑手於子頭。 指者。名曰,神手產圖。 子頭正臨而傍得手 英台对加

生此

からから

0年上二年無樓敬坂

頭高。誤脚尖先出 非倒生順臨而子 其狀恰如倒生而 臨盆露一 圖實驗詳倒生條 足。候之




を主

多い

)二月 | 上二十版成及

一 施二 带 圖。 左 左 。



C | | 內在村前

突起如地流圖。 **腹** 能此 學胎雙順其胎腹 りと一と一とと一大大人又は

府

市

元

下

而

変

数

C三十五 | 夹合村市

有機肯不能筆授

こことにといるがん

七年七

蓄水所致其 實驗一二學所體殘疾名 膨異常。胎中 姙 丁手足軟 **娠腹大棒** 短。 肢 其 形 如 、 亀 節 烱在 两 類 類 各 生圖 西濃紅。肉色

金色雅山色為其輕重而致天常後 竹身之所接而其效方限也告和缓 ~ 作發可谓養女然特有名。而其安 殺夫著婦科之書。求多题を尾 **筠屬之有志指齊物者。宜見諸文** 解而養其傳不然其取效雖少火止 無施打沒世者。不是打文部一也管 三三子世紀或友

於人則可也。何以見被久辭多產 愈高起手维起光比~相望打一鄉 金司討論極義公金一日之长,随高肆 問其道陽一而被人人的以為手雜 路兵既而奔走四方。後有名之士而 一國或諸倉回為取效打一四、養 也其大時家於北鄙也。距金屬三十 餘里雜風雨霜雪金~庭每岁其

天下其何不可手。而舍於是方是自 有其是我其多意必為巴方的全代 普陸宣公·在忠州、夏方考度 D. 其傳教不近代求名手。回不然常例之 心也。然則敬夫之善其過去、廣信的 夫宣公此醫也姓的官夏方書老 19大海省也好此海光特六七季 唯術其生公可以及物養人人之用 つこ 一色 子妻威及

養改~水而不止則其效而以及物光 又不止行为此也 前一所得了。别其歲出此差至必因 文化十年截沒愛面甚三月 桐園 壹收發撰

交政四辛日年践行

書林 同污掘或自太際橋北語藏 浪華心齊橋通北久太郎町 皇都同町 皇都堀川佛光寺下山町 河南四良兵箭 河南喜兵衛

